



(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 099 052** <sup>(13)</sup> **C1**  
(51) Int. Cl. <sup>6</sup> **A 61 K 31/045, 9/08**

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 96123975/14, 26.12.1996

(46) Date of publication: 20.12.1997

(71) Applicant:  
Ehpshtejn Oleg Il'ich (RU)

(72) Inventor: Vorob'eva Tamara Mikhajlovna[UA],  
Ehpshtejn Oleg Il'ich[RU], Il'chikov Mikhail  
Zakharovich[RU]

(73) Proprietor:  
Vorob'eva Tamara Mikhajlovna (UA),  
Ehpshtejn Oleg Il'ich (RU),  
Il'chikov Mikhail Zakharovich (RU)

(54) **MEDICINAL AGENT FOR RECOVERY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL HOMEOSTASIS DAMAGED BY ALCOHOL INTAKE**

(57) Abstract

FIELD: medicine, narcology. SUBSTANCE:  
medicinal agent is a potential preparation  
obtained by homeopathic method. The parent  
substance is ethanol (ethyl alcohol 95%,  
ethyl alcohol 90%, ethyl alcohol 70% or  
ethyl alcohol 40%) that is diluted by one

hundred times mainly with distilled water.

The preferable dilution is C12-C1000 and  
above. Agent is used for treatment of  
intoxication, abstinent, neurotic, psychotic  
and somatic disorders. EFFECT: enhanced  
effectiveness of treatment

RU 2 099 052 C1

RU 2 099 052 C1



(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 099 052** <sup>(13)</sup> **C1**  
(51) МПК<sup>6</sup> **A 61 K 31/045, 9/08**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 96123975/14, 26.12.1996

(46) Дата публикации: 20.12.1997

(56) Ссылки: 1. WO, заявка 87/05214, кл. А 61 К 31/045, 1987. 2. DE, заявка, 3829442, кл. А 61 К 31/045, 1990.

(71) Заявитель:  
Эпштейн Олег Ильич (RU)

(72) Изобретатель: Воробьева Тамара Михайловна[UA],  
Эпштейн Олег Ильич[RU], Ильчиков Михаил Захарович[RU]

(73) Патентообладатель:  
Воробьева Тамара Михайловна (UA),  
Эпштейн Олег Ильич (RU),  
Ильчиков Михаил Захарович (RU)

(54) ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА, НАРУШЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

(57) Реферат:

Использование: в медицине для лечения интоксикационных, абстинентных, неврологических, психических и соматических расстройств. Сущность изобретения: лекарственное средство представляет собой потенцированный препарат, полученный по

гомеопатическому методу. Исходное вещество - этанол (спирт этиловый 95%. Спирт этиловый 90%, спирт этиловый 70% или спирт этиловый 40%), сотенное разведение, преимущественно на дистиллированной воде. Преимущественно разведение С 12 - С 1000, и выше.

RU 2 099 052 C1

RU 2 099 052 C1

Изобретение относится к медицине, а именно к средствам для восстановления психофизиологического гомеостаза, нарушенного вследствие употребления этанола, и может быть использовано в основном для лечения хронического алкоголизма и его последствий (интоксикационных, абстинентных, невротических, психотических и соматических расстройств).

В медицинской практике известно использование спирта этилового (*Spiritus aethylicus*), синоним: винный спирт (*Spiritus vini*), в качестве антисептического и раздражающего лекарственного средства (см. например Машковский М. Д. Лекарственные средства. М. Медицина, 1972, ч. II, с. 449). При этом спирт применяют преимущественно наружно, и его терапевтические возможности весьма ограничены. Спирт при приеме внутрь в больших дозах, воздействуя на кору головного мозга, вызывает характерное алкогольное опьянение отравление.

Известно гомеопатическое лекарственное средство для профилактики и лечения алкоголизма, содержащее в десятичных потенциях серу, серную кислоту, мышьяк, пикоподий, рвотный орех, свинец, яд гремучей змеи, сернистый углерод (см. патент РФ N 2039561, кл. А 61 К 33/00, 1995). Однако эффективность воздействия этого препарата в значительной степени зависит от индивидуальной чувствительности организма и его функционального состояния.

Известно также лекарственное средство, содержащее потенцированный *Orium*, полученный на основе исходного наркотического вещества растительного происхождения опия (см. В. Швабе. Гомеопатические лекарственные средства. М. 1967, с. 255). Данное гомеопатическое средство имеет показания к применению для лечения в основном эмоциональных и невротических нарушений и характеризуется, как и вышеуказанные известные препараты, ограниченными функциональными (лечебными) возможностями для коррекции психофизиологического состояния человека.

Известно лекарственное средство для восстановления психофизиологического гомеостаза, содержащее этанол в концентрации  $10^{-3}$ - $10^{-4}$  М/л [1]. Данное средство в качестве блокирующего агента понижает пороговое значение кальциевой проводимости, что позволяет предотвратить тремор различной природы, но не снижает влечения к алкоголю и не оказывает существенного влияния на последствия алкогольного опьянения (абстинентный и интоксикационный синдромы).

Наиболее близким к изобретению является тонизирующее средство на основе "чистого" этанола в смеси с этанолом в разведении D8 по гомеопатическому методу, которое предназначено для уменьшения последствий воздействия алкоголя [2]. Однако указанный тоник после приема нескольких капель значительно снижает лишь внешние проявления алкогольного опьянения, такие как громкая речь, возбужденное поведение, слабость логического восприятия, переоценка собственных возможностей, но мало эффективен при лечении хронического алкоголизма.

Изобретение направлено на повышение

эффективности лекарственного средства для медикаментозного лечения алкоголизма и нарушений психофизиологического гомеостаза, обусловленных употреблением этанола.

Решение поставленной задачи достигается тем, что лекарственное средство для восстановления психофизиологического гомеостаза, нарушенного вследствие употребления алкоголя, на основе этанола в гомеопатическом разведении, согласно изобретению, содержит потенцированный этанол, полученный путем многократного последовательного разведения и встряхивания по гомеопатическому методу, в сотенном разведении, преимущественно C12-C1000 и выше на дистиллированной воде.

При этом в качестве исходного вещества при потенцировании этанола используют применяемый в медицинской практике спирт этиловый (винный) 95% спирт этиловый 90% спирт этиловый 70% или спирт этиловый 40%.

Терапевтический эффект заявленного потенцированного лекарственного средства, которое не оказывает нежелательных побочных действий, например в виде токсических, аллергических реакций, проявляется при лечении интоксикационных, абстинентных, психотических, невротических и соматических расстройств и обусловлен специфическим воздействием на метаболизм эндогенных биорегуляторов.

Лекарственное средство для восстановления психофизиологического гомеостаза готовят путем многократного последовательного разведения и встряхивания по гомеопатическому методу (см. В. Швабе. Гомеопатические

лекарственные средства. М. 1967, с. 5-28) на преимущественно дистиллированной воде в принятых в гомеопатической практике разведениях и лекарственных формах из исходного вещества: этанола или спирта этилового 95% представляющего собой смесь

этанола (этилового спирта) с водой, содержащую 95-98% по объему этилового спирта. Возможно приготовление лекарственного средства на основе спирта этилового 90% выпускаемого в виде смеси, содержащей 92,7 части спирта этилового 95% и 7,3 части воды; или спирта этилового 70% содержащего соответственно 67,5 части спирта 95% и 32,5 части воды; или спирта этилового 40% содержащего 36 частей спирта 95% и 64 части воды.

Потенцирование этанола производят осуществляя последовательные сотенные разведения с многократным встряхиванием каждого полученного разведения и использованием отдельных флаконов (пробирок) для каждого разведения. При этом сначала в одном флаконе разводят 1 часть исходного (материнского) этанола с 99 частями дистиллированной воды и производят "динамизацию" путем 10-100 сильных вертикальных встряхиваний, затем 1 часть полученного раствора разводят в другом флаконе с 99 частями дистиллированной воды и выполняют 10-100 сильных вертикальных встряхиваний и т.д. последовательно повторяя операции разведения и встряхивания до получения требуемого сотенного разведения (преимущественно C12-C1000, и выше).

Приготовленный таким образом потенцированный этанол обеспечивает эффективное купирование абстинентного синдрома и интоксикационного синдрома, оказывает терапевтическую эффективность при лечении психогических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, неврологических и соматических последствий употребления этанола (в том числе полиневриты и цирроз печени), психоорганического синдрома, связанного с злоупотреблением этанола, эффективно уменьшает влечение (психическое и/или физическое) к алкоголю.

Пример 1. Больной К. возраст 35 лет, поступил в наркологическую больницу с диагнозом: хронический алкоголизм П ст. псевдозапойная форма, состояние алкогольной абстиненции. Назначено потенцированный этанол С100, перорально, по 3 капли в столовой ложке кипяченой воды, ежечасно. Через 1 ч после первого приема больной заснул и спал 6 ч. После пробуждения отмечает исчезновение выраженных церебрастенических и гастралгических явлений, которые полностью исчезли к концу вторых суток употребления лекарственного средства.

Пример 2. Больная С. возраст 40 лет, страдает хроническим алкоголизмом П ст. находится в состоянии ремиссии в течение 1,5 лет. На фоне последней перенесенной абстиненции у больной возникли вегетативные приступы в виде тахикардии, повышенной потливости, сопровождающиеся аффектом страха. Приступы повторяются не реже 1 раза в неделю при малейшем волнении. Лечение у невропатологов и психотерапевтов безрезультатно. Назначено: потенцированный этанол С200 в виде водного раствора, по 5 капель каждые 10 мин при возникновении приступа и до его окончания. На фоне лечения приступы стали протекать более мягко, через 2 мес после начала лечения исчезли и в течение срока наблюдения (0,5 года) не возобновлялись.

Пример 3. Больной Ж. 48 лет, в течение 6 лет находится в психиатрической больнице с диагнозом: хроническая алкогольная энцефалопатия (Корсаковоподобный вариант). В течение 1,5 мес ежедневно получал в виде водного раствора потенцированный этанол С1000, по 5 мл, внутривенно 1 раз в день. На фоне лечения явления фиксационной амнезии заметно уменьшились, восстановилась ориентация в месте и во времени.

Пример 4. Больной Р. 60 лет, находился в течение 2 мес на лечении в неврологическом отделении ЦРБ с диагнозом: алкогольный полиневрит. Проводимое традиционное лечение результатов не принесло. Получал при проведении курса лечения потенцированный этанол в разведении С30 по 5 капель, 3 раза в день в течение 6 недель. На фоне лечения состояние больного заметно улучшилось, мышечная сила в нижних конечностях восстановилась до уровня, близкого к норме, атаксии нет.

Пример 5. Больной К. 26 лет, поступил в

психиатрическую больницу с диагнозом острый алкогольный делирий. В течение суток получал потенцированный этанол С1000, внутривенно, по 5 мл водного раствора 3 раза в день. Через 3 ч после начала лечения галлюцинаторная симптоматика исчезла. К концу суток состояние больного удовлетворительное, сон восстановился.

Пример 6. Больной О. 49 лет, находится на стационарном лечении с диагнозом: хронический алкогольный цирроз печени, декомпенсация. Несмотря на проводимое традиционное лечение состояние больного прогрессиивно ухудшалось. В течение 5 дней получал внутримышечно водный раствор потенцированного этанола С12 по 2 мл, 4 раза в день, что привело к заметному улучшению состояния: нормализовалась температура, исчезла желтушность, восстановился естественный стул, заметно уменьшилась слабость. В дальнейшем лечился традиционными средствами.

Пример 7. Больной К. 37 лет, диагноз: хронический алкоголизм II ст. состояние ремиссии 2 года, обратился к врачу-наркологу с жалобами на появление осознаваемого им влечения к алкоголю, снов с алкогольной тематикой, раздражительностью. Назначено: потенцированный этанол С1000 в таблетках, приготовленных пропитыванием 0,2 г нейтрального вещества (молочного сахара) до насыщения потенцированным раствором этанола, по одной таблетке 2 раза в день. При посещении поликлиники через 2 недели лечения больной отмечает полное исчезновение "тяги" к спиртному. Настроение ровное, сновидений нет.

Пример 8. Больной подросток Д. 15 лет, доставлен скорой помощью в приемное отделение больницы с диагнозом: острое алкогольное отравление, коматозное состояние. Поскольку, со слов матери больного, у него имеется аллергия практически ко всем лекарствам, во избежание осложнений врачом бригады скорой помощи каждые 5-10 мин на всем этапе транспортировки капельно в полость рта больного вводился по одной капле потенцированный этанол С200. К моменту осмотра больного в приемном покое его состояние значительно улучшилось, нарушение сознания ограничено легкой оглушенностью, патологических рефлексов нет, зрачки умеренно расширены, дыхание свободное, артериальное давление нижняя граница нормы.

#### Формула изобретения:

Лекарственное средство для восстановления психофизиологического гомеостаза, нарушенного вследствие употребления алкоголя, на основе этанола в гомеопатическом разведении, отличающееся тем, что содержит потенцированный этанол, полученный путем многократного последовательного разведения и встряхивания по гомеопатическому методу, в сотенном разведении, преимущественно С12 °С С1000 и выше, на дистиллированной воде.